

RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE

***Solo se realiza preparación cuando es por sospecha de cálculos renales (litotricia).
Este examen se puede realizar desde los 0 años en adelante.***

El día del examen.

- Asistir en completas ayunas.
Debe presentarse en caja con 20 minutos de anticipación a la hora de la cita.
- Tener agendada y facturada la cita (presentar la factura en el servicio de imágenes)
- Asistir en completas ayunas.
- Se sugiere venir con un acompañante que no esté en embarazo, si es menor de edad con dos acompañantes.
- Orden médica con datos clínicos y la respectiva autorización de servicios. Presentar historia clínica o resumen de historia clínica.
- Presentar exámenes previos si los tiene.
- No traer objetos metálicos (collares, pulseras, relojes, aretes, correa).
- Si la paciente está o cree estar embarazada, debe informar inmediatamente al personal de radiología.

PACIENTES DESDE 0 MESES HASTA LOS 5 AÑOS NO REQUIEREN PREPARACIÓN, SÓLO DEBEN SEGUIRSE LAS SIGUIENTES INDICACIONES

- No tomar leche de tarro o bolsa.
- Tener 3 horas de ayuno.

PREPARACIÓN PARA PACIENTES

Un día antes del examen

- **Desayuno:** galletas de soda o ducales con aromática o agua de panela.
- **Almuerzo:** sopa de arroz, sopa de pastas o caldos sin grasa, sin carnes rojas y sin ensaladas.
- **Algo:** Gelatina. (Piña, limón, naranja, etc.)
- **Cena:** debe ser a las 6:00 p.m. se debe comer igual que al almuerzo.
- A partir de este momento no puede consumir alimento solido alguno.
- No consumir lácteos.
- No consumir chicle.
- No fumar.
- No tomar líquidos que contengan gas.

DESDE LOS 7 HASTA LOS 13 AÑOS

- A las 7:00 p.m. debe tomarse $\frac{1}{4}$ frasco de CITROMEL
- A las 9:00 p.m. debe tomarse el otro $\frac{1}{4}$ de CITROMEL.
- Tome un litro más de líquidos hasta las 12:00 p.m.

Solo puede consumir gelatina a las 10:00 p.m. (Piña, limón, naranja, etc.)

PREPARACIÓN PARA PACIENTES DESDE LOS 14 AÑOS EN ADELANTE:

- A las 7:00 p.m. debe tomarse medio frasco de TRAVAD ORAL diluido en medio litro de agua de panela, jugos, gaseosa como Naranjada, Manzana o Gatorade

- A las 9:00 p.m. debe tomarse el otro medio frasco de TRAVAD ORAL diluído en medio litro de agua de panela, jugos, gaseosa como Naranja, Manzana o Gatorade.
- Tome un litro más de líquidos hasta las 12:00 p.m.
- No suspender los medicamentos que esté tomando, los debe ingerir con poca agua.